

ブルーベリー〔ブルーシャワー：ラビットアイ系〕

ツツジ科・スノキ属 原産地:北米東北部

落葉性 小果樹

栽培暦	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
開花期	■											■
収穫期				■	■	■						
植えつけ・植えかえ						■	■	■	■			
肥料（庭植え）		■	■		■	■					■	■
剪定										■	■	

育て方

栽培環境

水はけの良い、日当たりの良い場所を好みます。
同系2品種（ハイブッシュ系・ラビットアイ系）以上を植えないと実が付きにくいとされます。

収穫と利用

芳香の果実は甘酸っぱく、生食やジャム、ジュースなどの加工品として利用されています。
収穫期：ラビットアイ系 7月下旬から9月下旬・ハイブッシュ系 6月下旬から7月中旬

病気と害虫

病虫害対策はあまり必要としません。

植えつけ・ 植えかえ

通気・排水がよい酸性土にするため、植え穴の土はピートモスや鹿沼土を使ってつくります。

主な作業

肥料：特にPHには敏感です。あまり与えすぎないように気をつけてください。

マイヤーレモン

ミカン科・ミカン属属

原産地:中国

栽培暦	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
開花期		■										
植えつけ・植えかえ	■											■
肥料(庭植え)											■	■
剪定											■	■

育て方

栽培環境

水はけの良い、日当たりの良い場所を好みます。
レモンとオレンジが自然にかけあわさって生まれた果物です。

収穫と利用

果皮は薄いので皮ごと食べることもできます。
熟してくるとオレンジ色に色が濃くなります

病気と害虫

耐病性が強いが害虫はほかの柑橘類と変わりません。

植えつけ・ 植えかえ

通気・排水がよい土にするため、植え穴を苗よりも一回り大きな穴を掘り、土に堆肥や腐葉土を混ぜ込みます。

主な作業

病虫害にあった枝、前年の秋に伸びた枝、充実していない枝などを切り詰めて樹形を整え、株の内側に光が当たるようにします

フェイジョア 〔アポロ〕

フトモモ科・フェイジョア属

原産地：ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル南部

栽培暦	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
開花期												
収穫期												
植えつけ・植えかえ												
肥料（庭植え）												
剪定												

育て方

栽培環境	耐寒性があり関東中部以西であれば一年中、戸外で育てることができます。生育は旺盛で病害虫の心配もほとんどなく家庭栽培におすすめです。結実年数は、苗で2～5年です。
収穫と利用	収穫期になり熟してくると自然落果します。落ちたものは完熟しており、すぐに食べられます。まだ木になっている果実を収穫した場合は、室温（15～20℃）で2週間ほど追熟させます。
病気と害虫	病害虫対策はあまり必要としません。
植えつけ・植えかえ	日当たりの良い環境を好みます。亜熱帯の果樹ですが比較的寒さに強く-10℃程度まで耐えると言われています。常緑樹ですが、寒さが強過ぎると葉を落とします。別品種を植えると実つきがよいでしょう。
主な作業	混みあった枝や樹の内側に向かって伸びる枝など、邪魔な枝を付け根から切り落とす「間引き剪定」が基本となります。枝の先端近くに花芽ができるので全体を刈り込んだり切り戻すようなことは避けます。